



ตารางการให้วัคซีนในเด็กและวัยรุ่นไทย 2567

แบบทำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

วัคซีนจำเป็นที่ต้องให้กับเด็กทุกคน

วัคซีน	อายุ	แรกเกิด	1 เดือน	2 เดือน	4 เดือน	6 เดือน	9-12 เดือน	18 เดือน	2-2½ ปี	4-6 ปี	11-12 ปี
บีซีจี ¹ (BCG)		BCG									
ตับอักเสบบี ² (HB)		HB1	(HB2)	DTwP-HB- Hib-1	DTwP-HB- Hib-2	DTwP-HB- Hib-3					
คอตีบ-บาดทะยัก- ไออกูโนนิดทั้งเซลล์ ³ (DTwP)							DTwP กระตุ้น 1		DTwP กระตุ้น 2		Td และ ทุก 10 ปี
ชิบ ⁴ (Hib)											
โปลิโอ ⁵ ชนิดน้ำ (IPV) และกิน (OPV)				IPV1	IPV2	OPV3		OPV กระตุ้น 1		OPV กระตุ้น 2	
โรต้า ⁶ (Rota)				Rota1	Rota2	(Rota3)					
หัด-คางทูม-หัดเยื่อรัมณ์ ⁷ (MMR)							MMR1	MMR2			
ไข้ส้มองอักเสบเจือชีนิดเชื้อมีชีวิต ⁸ (live JE)							JE1		JE2		
ไข้หวัดใหญ่ ⁹ (Influenza)							Influenza ให้ปัลศรั้ง (การให้ครั้งแรกในเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ให้ 2 เช็ม ห่างกัน 1 เดือน)				
โคโวิด-19 (COVID-19)							ดูคำแนะนำในการฉีดตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย				
เอชพีวี ¹⁰ (HPV)											เด็กหญิงปีละ 5 2 เช็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

วัคซีนอื่นๆ ที่อาจให้เสริม หรือทดแทน

วัคซีน	อายุ	2 เดือน	4 เดือน	6 เดือน	12-15 เดือน	18 เดือน	2-2½ ปี	4 ปี	6 ปี	9 ปี	11-12 ปี	15 ปี
คอตีบ-บาดทะยัก-ไออกูโนนิดทั้งเซลล์ ³ หรือ ชนิดทั้งเซลล์ (DTaP/DTwP, Tdap หรือ TdaP) ตับอักเสบบี ² โปลิโอ ⁵ ชนิดน้ำ (IPV) ชิบ ⁴ (Hib)		DTaP/DTwP -HB-IPV- Hib1	DTaP/DTwP -(HB)-IPV -Hib2	DTaP/DTwP -HB-IPV- Hib3		DTaP-IPV-(Hib4) กระตุ้น 1		DTaP-IPV หรือ Tdap-IPV กระตุ้น 2 หรือ TdaP			Tdap หรือ TdaP ต่อไป Td หรือ Tdap/TdaP ทุก 10 ปี	
นิวโมค็อกคัลซ์ชนิดคอกอนจูเกต ¹¹ (PCV)		PCV1	PCV2	(PCV3)	PCV4							
ไข้ส้มองอักเสบเจือชีนิดเชื้อมีชีวิต ⁸ (Inactivated JE)					JE1, JE2 ห่างกัน 4 ลับดาห์ และ JE3 อีก 1 ปี							
อีวี 71 ¹² (EV71)					EV71 2 เช็ม ห่างกัน 1 เดือน							
ตับอักเสบเอ ¹³ (HAV)					HAV ชนิดเชื้อมีชีวิต ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน ชนิดเชื้อมีชีวิต ฉีดครั้งเดียวเมื่ออายุ 18 เดือนขึ้นไป							
อีสุกอีส ¹⁴ (VZV) หรือวัคซีนรวม หัด-คางทูม-หัดเยื่อรัมณ์-อีสุกอีส (MMRV)					VZV1 (หรือ MMRV1)	VZV2 (หรือ MMRV2)						
ไข้หวัดใหญ่ ⁹ (Influenza)					Influenza ให้ปัลศรั้ง (การให้ครั้งแรกในเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ให้ 2 เช็ม ห่างกัน 1 เดือน)							
เอชพีวี ¹⁰ (HPV)											HPV 2 เช็ม ห่างกัน 6-12 เดือน	
ไข้เลือดออก ¹⁵ (DEN)								DEN 2 หรือ 3 เช็ม ขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีน				
พิษสุนัขบ้า ¹⁶ (Rabies) ก่อนการลัมผัลโรค					2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 7 วัน (หรือ 21 วัน)							

